



<https://www.revistaneurocirugia.com>

## P002 - METÁSTASIS CLIVAL TARDÍA DE CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS

J.L. Gil-Salu<sup>1</sup>, I. Millán Ortega<sup>2</sup>, I. Iglesias Lozano<sup>1</sup> y M. Beltrán Ruiz-Henestrosa<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Servicio de Neurocirugía; <sup>2</sup>Servicio de Anatomía-Patológica, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

### Resumen

**Introducción:** Las metástasis cerebrales y de base de cráneo a partir de un carcinoma renal (CaRe) acontecen en un rango muy variable según las series en el 4-24% de los pacientes, habitualmente en un intervalo de 1-3 años tras la nefrectomía. La localización en base de cráneo como una lesión osteolítica, suele ser poco frecuente, y si esto acontece tras 8 años de la nefrectomía en una paciente "libre de enfermedad" hasta entonces, se puede considerar excepcional.

**Objetivos:** Presentar el caso clínico de una paciente con metástasis única tardía en la base del cráneo, 8 años después de una nefrectomía por un CaRe de células claras.

**Caso clínico:** Mujer de 56 años de edad que debuta con diplopía por paresia de VI par derecho. Entre sus AP destaca la realización de una nefrectomía derecha 8 años antes, en 2007, por carcinoma renal de células claras. El estudio de extensión no muestra otras lesiones en relación con la malignidad referida, pero en la TAC y RM se visualiza una gran lesión heterogénea y osteolítica que fue intervenida por abordaje transnasal transesfenoidal con exéresis parcial de la misma. La AP demostró se trataba de una infiltración metastásica por CaRe de células claras.

**Discusión:** Se presenta el manejo pre- intra- y postoperatorio de la paciente y la terapia complementaria llevada a cabo.