



# Neurocirugía

<https://www.revistaneurocirugia.com>



## O-TRA-17 - Lesiones del nervio ciático poplíteo externo a nivel del cuello del peroné

*B. Mansilla, A. Isla y S. de Santiago*

*Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario La Paz, Madrid.*

### Resumen

**Introducción:** Las lesiones a nivel del cuello del peroné pueden verse en frecuencia después del síndrome del túnel del carpo y del atrapamiento del nervio cubital a nivel del codo.

**Objetivos:** Realizamos una revisión de los últimos 7 años de 22 pacientes en los que estudiamos cuales han sido las causas del tratamiento quirúrgico realizado del nervio ciático poplíteo externo a nivel del cuello del peroné. Valoramos la indicación quirúrgica y los resultados.

**Material y métodos:** Los pacientes presentaban edades entre 12 años y 65 años, y las causas fueron 9 de origen compresivo espontáneo, 8 por traumatismos y cirugía de la rodilla y 5 tumorales (2 schwannomas, 2 quiste sinovial y 1 neurofibroma).

**Resultados:** Los pacientes intervenidos de síndrome compresivo espontáneo mejoraron favorablemente en 7 casos y en dos levemente. Los pacientes de origen traumático o quirúrgico de rodilla mejoraron favorablemente en 6 y dos no mejoraron. Los pacientes con tumores tratados, mejoraron del déficit motor en todos los casos.

**Conclusiones:** Las lesiones del nervio ciático poplíteo externo suelen tener una evolución favorable con la cirugía. En los pacientes con traumas o intervenciones de rodilla la causa de no recuperarse puede asociarse principalmente a un síndrome compartimental que produce una isquemia y consecuentemente una afectación grave del nervio, requiriendo en algunos casos una cirugía descompresiva en agudo, considerándose de urgencia neuroquirúrgica.