



# Neurocirugía

<https://www.revistaneurocirugia.com>



## C0206 - LINFOMA PINEAL: PRESENTACIÓN DE UN CASO INFRECUENTE Y ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

J.A. Ruiz Ginés<sup>1</sup>, A.F. Dusuky Al-Turky<sup>1</sup>, O. Balcázar Rojas<sup>1</sup>, F. Jiménez Aragón<sup>2</sup>, M. Villena Martín<sup>1</sup> y J.M. Borrás Moreno<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Servicio de Neurocirugía; <sup>2</sup>Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España.

### Resumen

**Objetivos:** El linfoma primario del sistema nervioso central (LPSNC) es una variante infrecuente de linfoma no Hodgkin (LNH) extranodal con afectación cerebral, leptomenígea, ocular y espinal, sin evidencia de enfermedad sistémica. Representa el 4% de los tumores primarios del SNC, con una incidencia ajustada muy baja (4 casos por millón). Edad media: 45-65 años, sin diferencia por sexo. El factor de riesgo más importante es la inmunodepresión, estableciéndose la hipótesis, para los pacientes inmunocompetentes, del papel que pueden jugar infecciones virales previas y/o enfermedades autoinmunes concomitantes. Clínicamente, presentan manifestaciones propias de su extensión tumoral periventricular (déficit neurológico focal, clínica neuropsiquiátrica, hipertensión intracraneal, crisis epilépticas y manifestaciones oculomotoras). Presentamos un raro caso de linfoma pineal agresivo, considerando que la revisión bibliográfica describe, hasta la fecha, únicamente, diez casos.

**Métodos:** Paciente de 42 años de edad afecto de cuadro clínico consistente en cefalea holocraneal, opresiva, náuseas, vómitos, bradipsiquia y oftalmoparesia concordante con síndrome de Parinaud.

**Resultados:** El estudio de neuroimagen muestra la presencia de una masa homogénea (2 cm de diámetro), isointensa en T1 e hiperintensa en T2, comprimiendo el Acueducto de Silvio, con importante edema perilesional, condicionando edema papilar bilateral, secundario a hipertensión intracraneal. Estudio testicular normal. Fue intervenido por vía endoscópica, resecándose parcialmente la lesión, con realización simultánea de ventriculostomía endoscópica y toma de LCR para citología. Estudio anatomopatológico: Linfoma B de células grandes difuso, CD5 positivo.

**Conclusiones:** El linfoma cerebral presenta un predominio supratentorial, pero la afectación pineal resulta excepcional, con un mecanismo patogénico que podría derivar de un particular tropismo mediado por moléculas de adhesión celular (CD44/CD18). Se ha descrito la presencia de ADN del virus Epstein-Barr (VEB) en las células tumorales tanto de pacientes inmunocompetentes como inmunodeprimidos, que podría, según algunos autores, inducir mutaciones genéticas que favorecerían este proceso.