



Neurocirugía



<https://www.revistaneurocirugia.com>

V0474 - ABORDAJE SUPRACEREBELOSO INFRATENTORIAL: RIESGO DE NECROSIS CUTÁNEA SECUNDARIA A OCLUSIÓN ACCIDENTAL DE LA ARTERIA OCCIPITAL TRAS EMBOLIZACIÓN TUMORAL CON PVA

K.M. Piña Batista¹, K.Y. Álvarez Reyes de Piña¹, S. Carnero López², J. Alonso Claro², M.Á. García Palleró², B. Álvarez Fernández² y M. Gutiérrez Villanueva²

¹Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España. ²Hospital Vital Álvarez Buylla, Asturias, España.

Resumen

Objetivos: Mostrar el vídeo de la técnica quirúrgica y datos radiológicos del abordaje supracerebeloso infratentorial en un meningioma de fosa posterior y la necrosis cutánea ocurrida por embolización accidental de la arteria occipital por polivinil alcohol (PVA).

Métodos: Mujer de 41 años que debuta con lateropulsión derecha y disartria leve de 3 meses de evolución y carácter progresivo. Tras RM que mostró Masa sólida de 37 mm de características extraaxiales e hipervascular, con cola dural a lo largo del borde de la incisura del tentorial derecha, con importante efecto de masa locorregional, y distorsión del cuarto ventrículo. La lesión presentó un realce muy intenso con una curva de perfusión característica de meningioma. Dada la irrigación tumoral por múltiples vasos meníngeos de mediano calibre, originarios de la arteria occipital, se realizó embolización con polivinil alcohol previo a la cirugía. Es llevada a quirófano de manera programada, realizándose craneotomía suboccipital y abordaje supracerebeloso infratentorial, bajo control neurofisiológico. En el seguimiento neurológico en planta, se apreció necrosis e infección cutáneas de región occipital derecha por embolización de arteria occipital ipsilateral, comprobado angiográficamente.

Resultados: Se procedió a tumorectomía completa. Resolución de clínica neurológica de manera progresiva. La anatomía patológica mostró meningioma meningotelial. Resolución de necrosis e infección cutáneas tras desbridamiento e injerto cutáneo muscular pediculado arteriovenoso.

Conclusiones: El abordaje supracerebeloso infratentorial es un abordaje seguro y práctico para tratar meningiomas adheridos a incisura tentorial. La necrosis occipital por embolización accidental por polivinil alcohol de la arteria occipital es una complicación excepcional, con ningún caso hallado en la literatura, y debe tenerse en cuenta previo tratamiento embolizador. El injerto cutáneo-muscular pediculado es una técnica fiable para el tratamiento de este tipo de complicaciones.