



# Neurocirugía



<https://www.revistaneurocirugia.com>

## C0307 - VALORACIÓN DE MARCADORES HEMATOLÓGICOS PREOPERATORIOS EN EL PRONÓSTICO DE GLIOMAS DE ALTO GRADO

A. Antuña Ramos<sup>1</sup>, M.A. Álvarez Vega<sup>1</sup>, J. Rodríguez Castro<sup>2</sup>, V. Martín Fernández<sup>2</sup>, C. Rodríguez Sánchez<sup>2</sup> y P. Reimunde Figueira<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España. <sup>2</sup>Universidad de Oviedo, Oviedo, España.

### Resumen

**Objetivos:** Estudiar la relación entre marcadores hematológicos preoperatorios y supervivencia en gliomas de alto grado. Estudiar la relación de dichos marcadores con otros factores como edad del paciente, Karnofsky, tamaño tumoral y tiempo libre de enfermedad.

**Métodos:** Estudio retrospectivo de 30 pacientes operados durante los años 2014 y 2015. Se recogieron los siguientes datos: edad, sexo, tiempo libre de enfermedad (TLE), supervivencia, tamaño de la lesión, grado de resección, proximidad a la zona ventricular, Índice de Karnofsky, ratio neutrófilo/linfocito (NLR), ratio plaquetas/linfocitos (PLR), ratio monocito/linfocitos (MLR), anchura distribución de células rojas (DCR), captación de contraste, anatomía patológica y marcadores genéticos (mMGMT, m IDH1, phTEN, y aEGFR). Análisis estadístico mediante el programa IBM-SPSS 23.0.

**Resultados:** La edad media fue 60, 17 años y el volumen medio de la lesión 60,6 cm<sup>3</sup>. Tiempo libre de enfermedad medio de 14,4 meses y la supervivencia media de 20 meses. Existe una asociación estadística entre: la NLR y el TLE a los 12 meses, la supervivencia a largo plazo (24 y 30 meses), y la proximidad a la zona ventricular la MLR y el TLE a los 4,5 y 6 meses. Encontramos una asociación de riesgo entre: la NRL y el TLE a los 4,5 meses y la supervivencia a los 8 meses; la PLR y el TLE a los 4,5 meses; la supervivencia a los 8 meses y el RDW y la supervivencia a los 8 meses. No hemos encontrado asociación estadística ni de riesgo con otros factores como tamaño de la lesión, factores genéticos, grado de resección o Karnofsky.

**Conclusiones:** El factor más importante desde el punto de vista pronóstico en los factores inflamatorios es la relación entre NLR y la supervivencia a largo plazo y el TLE. Será necesario analizar si por su fácil determinación, estos factores inflamatorios pueden complementar el seguimiento de estos pacientes.