




# Neurocirugía



<https://www.revistaneurocirugia.com>

## C0407 - PLAGIOCEFALIA ANTERIOR POR CIERRE DE LA SUTURA FRONTOESFENOIDAL

*J.M. Saceda Gutiérrez, F. Carceller Benito y E. Gómez García*

*Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.*

### Resumen

**Objetivos:** Presentar el caso de un paciente con plagiocefalia anterior debido al cierre precoz de la sutura fronto-esfenoidal lateral.

**Métodos:** Paciente de 6 meses que es diagnosticado en consulta externa de posible cierre de sutura coronal izquierda. EF: signos de plagiocefalia anterior izquierda.

**Resultados:** TAC craneal 3D: cierre de sutura frontoesfenoidal lateral izquierda. Suturas coronales permeables. PQ: se llevó a cabo una suturectomía frontoesfenoidal abierta con avance fronto-orbitario bilateral. El paciente evolucionó de forma favorablemente.

**Conclusiones:** La craneosinostosis por el cierre de la sutura fronto-esfenoidal es una patología muy poco frecuente y cuyo diagnóstico clínico es difícil. El tratamiento mediante el avance fronto-orbitario bilateral, similar al tratamiento empleado en el cierre precoz de la sutura coronal unilateral, es la técnica de la de elección y ofrece buenos resultados.