



# Neurocirugía



<https://www.revistaneurocirugia.com>

## C0452 - GLAUCOMA SECUNDARIO A POSICIÓN PRONO EN CIRUGÍA ESPINAL

*J. Dorado Capote, E. Negro Moral, E. Yagui Beltrán y J. Solivera Vela*

*Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España.*

### Resumen

**Objetivos:** Presentar un extraño caso de glaucoma secundario a la posición en prono en una cirugía de raquis.

**Métodos:** Paciente mujer de 64 años que es intervenida de estenosis cervical C3-C6 y mielopatía secundaria siendo colocada en posición prono para realización de laminoplastia C4-C6 y artrodesis a masas laterales C3-C6 bilateralmente. Tras la intervención, presenta una evolución favorable, sin focalidad neurológica de novo y siendo dada de alta a las 72h. A la semana de la intervención comienza con clínica de dolor ocular y pérdida de visión progresiva en ojo derecho, siendo diagnosticada de glaucoma agudo e intervenida para evitar la pérdida visual completa.

**Resultados:** Tras hacer una revisión de la literatura, se trata de una complicación posible, aunque muy infrecuente, en la que la posición en prono, muy habitual en nuestra práctica clínica de cirugía de raquis, produce un aumento de la presión intraocular (PIO), y secundariamente glaucoma agudo.

**Conclusiones:** A la hora de colocar a un paciente en posición prono se recomienda tener en cuenta aquellos pacientes que presentan antecedentes oculares y tomar medidas para evitar el aumento de la PIO, y de esta forma la aparición de una glaucoma agudo y déficit visual.