



<https://www.revistaneurocirugia.com>

## C-0424 - ANEURISMA NO ROTO DE ARTERIA COROIDEA POSTERIOR: ABORDAJE MINIPTERIONAL

*M. Sánchez Casas, M. Rico Pereira, J. Aíbar Durán, B. Freixer Palau, M. Oladotun Anka, J.D. Patino Alvarado, C. Asencio Cortés y F. Muñoz Hernández*

*Neurocirugía, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España.*

### Resumen

**Objetivos:** Se presenta el vídeo del abordaje quirúrgico mediante craneotomía minipterioral y clipaje de aneurisma de arteria coroidea anterior derecha.

**Métodos:** Paciente mujer de 36 años asintomática, con múltiples antecedentes familiares de HSA aneurismática. Se realiza un angio-TC y una arteriografía cerebral donde se objetiva un aneurisma sacular en la cara posterior de la ACI derecha en relación con la emergencia de la arteria coroidea anterior ( $3 \times 2,5$  mm y 2 mm de cuello).

**Resultados:** Se decide realizar un abordaje minipterioral derecho. Se coloca la paciente en decúbito supino, realizando craneotomía y posterior fresado del ala esfenoidal con clinoidectomía anterior extradural. Tras la apertura dural se procede a la disección del Silvio anterior hasta exponer la ACI, ACA, ACM, arteria coroidea anterior (AcorA) y arteria comunicante posterior. Se observa el aneurisma descrito en la emergencia de la AcorA y se procede a clipaje temporal de la ACI derecha durante 90 seg, en los cuales se consigue clipaje correcto del aneurisma definitivo comprobado con la administración de verde indocianina. La paciente presenta una buena evolución posoperatoria, manteniéndose en GCS 15, con una leve diplopía inicial con movimientos oculares conservados que se corrige, sin otras focalidades. No se observan complicaciones isquémicas o hemorrágicas en la angio-TC de control a las 24 horas. No se observan alteraciones campimétricas ni en la agudeza visual en las valoraciones oftalmológicas ambulatorias. Se realiza una nueva angiografía a los 5 meses que muestra correcta exclusión del aneurisma.

**Conclusiones:** El abordaje minipterioral con extirpación de la clinoides anterior extradural resultó efectivo para el clipaje quirúrgico de un aneurisma de arteria coroidea anterior.