



# Neurocirugía



<https://www.revistaneurocirugia.com>

## O-027 - DISPLASIA CORTICAL DE FONDO DE SURCO. ENTIDAD CLÍNICO-PATOLÓGICA PROPIA

J.M. Vidal Miñano<sup>1</sup> y G. Olivares Granados<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España; <sup>2</sup>Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España.

### Resumen

**Introducción:** Las DCF son causa frecuente de epilepsia refractaria (ER), sobre todo en niños, siendo la DCFS un subtipo de difícil diagnóstico.

**Objetivos:** Definir la DCFS como entidad propia, exponer los resultados de nuestra serie y compararlos con la literatura.

**Métodos:** Estudio retrospectivo de 17 pacientes intervenidos en Hospital Virgen de las Nieves (Granada) de DCFS desde 2011 al 2022. Las variables fueron recogidas mediante el Portal Clínico Diraya del SAS y se analizaron de forma descriptiva.

**Resultados:** De los 17 pacientes, 13 fueron mujeres y 4 hombres. La edad media de inicio de las crisis fue 5 años y de realización de cirugía fue 25 años. La mitad aprox. presentaron un único tipo de crisis y la otra mitad varios tipos de crisis. 15 pacientes presentaron concordancia entre la clínica y las pruebas complementarias. En todos los pacientes, se realizó RM 3T, PET y videoEEG; así como resección localizada de la DCFS guiada con MNIO y ECoG, teniendo que reintervenirse 4. La localización de la lesión fue principalmente frontal y en hemisferio derecho. En 3 pacientes solamente se les realizó estudio prequirúrgico con electrodos, 2 subdurales y 1 subdural-profundo. Según la Escala de Engel, el 82% tuvieron un estadio 1 tras la cirugía dónde a solo 2 del total se les pudo retirar la medicación.

**Conclusiones:** La evaluación prequirúrgica en DCFS es compleja, ya que son lesiones que pueden ser altamente epileptógenas y no visualizarse en RM. El éxito de la cirugía depende de adecuada identificación de la lesión y posibilidad de realizar resección completa del tejido displásico lo más localizada posible. Para ello, el avance en los métodos diagnósticos prequirúrgicos y procedimientos quirúrgicos guiados está permitiendo ofrecer un tratamiento exitoso en pacientes con DCFS considerados 'no lesionales' y pacientes con lesiones en 'corteza elocuente'.