



# Neurocirugía



<https://www.revistaneurocirugia.com>

## O-036 - RADIOCIRUGÍA GAMMA KNIFE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS HAMARTOMAS HIPOTALÁMICOS

V. Casitas Hernando<sup>1</sup>, N. Martínez Moreno<sup>1</sup>, P. García Feijoo<sup>2</sup>, J.M. Viñuela Prieto<sup>2</sup>, J. Guitiérrez Sarraga<sup>1</sup> y R. Martínez Álvarez<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Hospital Ruber Internacional, Madrid, España; <sup>2</sup>Hospital Universitario La Paz, Madrid, España.

### Resumen

**Introducción:** Dada su localización a nivel del suelo del tercer ventrículo, túbér cinerium y/o cuerpos mamilares, el tratamiento de los hamartomas hipotalámicos ha sido siempre un importante reto terapéutico neuroquirúrgico.

**Objetivos:** En el presente trabajo presentamos los resultados a largo plazo en el manejo de los hamartomas hipotalámicos con Radiocirugía Gamma Knife (GKRS).

**Métodos:** Se realizó un análisis retrospectivo de la serie de hamartomas hipotalámicos tratados en un único centro con Gamma Knife entre 1997 y 2021. Se registraron las características demográficas, clínicas (epilepsia, patología psiquiátrica y endocrinológica) y radiológicas (agrupando a los pacientes en función de las clasificaciones de Delalande y Regis). Se registró la respuesta al tratamiento, así como la aparición de complicaciones derivadas del mismo.

**Resultados:** Un total de 39 pacientes fueron tratados con GKRS. La edad media fue de  $20,59 \pm 13,77$  años con un predominio femenino (56,4%). Todos los pacientes presentaron epilepsia farmacorresistente, que fue en forma de crisis gelásticas (97,4%), crisis focales con alteración del nivel de consciencia (64,1%) y/o crisis generalizadas tonicoclónicas (64,1%). Pubertad precoz estaba presente en 12,5% y síntomas psiquiátricos en 56,4%. La dosis de prescripción media fue de  $18,8 \pm 2,33$  Gy con una isodosis del  $60,9 \pm 9,20\%$ . El volumen medio de prescripción fue  $1,02 \pm 0,77$ cc. Un total de 14 pacientes (35,8%) precisó de un segundo tratamiento con GKRS en un período medio de 4,5 años. El seguimiento medio fue de  $8,52 \pm 4,73$  años. Al final del mismo un 66,7% de los pacientes presentó un control favorable de crisis (Engel I-II). Los pacientes presentaron una respuesta positiva respecto a los síntomas psiquiátricos. Las complicaciones fueron escasas y menores en forma de: cuadrantanopsia (2,5%), aumento transitorio de la temperatura (2,5%), hipotiroidismo (2,5%) y obesidad hipotalámica (2,5%).

**Conclusiones:** El tratamiento con GKRS en pacientes con hamartomas hipotalámicos es seguro y eficaz, con unos resultados que se mantienen a largo plazo.