Neurocirugia. 2024;35(Supl 1):S240

Neurocirugía

https://www.revistaneurocirugia.com

P-110 - HAMARTOMA LIPOFIBROMATOSO DE NERVIO MEDIANO: A PROPÓSITO DE UN CASO

A. González Álvarez, F.J. Ibáñez Plágaro, E. Iglesias, E. Quevedo, M.G. Iglesias, M. Álvarez, A. Cuesta, J. Robla

Complejo Asistencial de León, León, España.

Resumen

Introducción: El hematoma lipofibromatoso es un tipo poco común de tumoración benigna de crecimiento lento que surge debido a la proliferación de adipocitos maduros en el seno del peri y epineuro de los nervios periféricos. Se afectan predominantemente los nervios del miembro superior y, en especial, al nervio mediano.

Caso clínico: Se presenta el caso de una paciente de 23 años que consulta por crecimiento a lo largo de unos 3 años de bultoma en cara radial de muñeca izquierda, acompañado de parestesias e hiperestesia en región tenar y primer dedo de la mano. Tras realización de RM de muñeca izquierda donde se identifica probable hematoma de nervio mediano, se somete a procedimiento quirúrgico consistente en descompresión nerviosa mediante tenotomía a nivel del túnel carpiano y citorreducción tumoral, sin asociar déficit neurológico posterior. El estudio anatomopatológico es concluyente para hamartoma lipofibromatoso.

Discusión: El hematoma lipofibromatoso de nervio mediano es un tumor poco frecuente que exhibe una apariencia típica en la resonancia magnética y que puede precisar de procedimiento quirúrgico con el objetivo de aliviar la sintomatología de origen compresivo y la corroboración de la sospecha diagnóstica.

1130-1473/© 2024 Sociedad Española de Neurocirugía. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.