Neurocirugia. 2025;36(Supl 1):S95

Neurocirugía

https://www.revistaneurocirugia.com

P-040 - HIPERCIFOSIS CERVICAL ADQUIRIDA IDIOPÁTICA O *DROPPED HEAD SYNDROME* (DHS)

L. Franco Arreytunandía, D. Mesa Collantes, A. Prada Vega, J. Riqué Dormido, F. Rodríguez Peña

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España.

Resumen

Introducción: Presentamos un caso de hipercifosis cervical adquirida en paciente joven. Esta entidad es conocida también como *dropped-head syndrome* o *chin-on-chest deformity.* Exponemos un caso de hipercifosis cervical adquirida en una mujer joven y el tratamiento quirúrgico realizado. Exponer un resultado quirúrgico satisfactorio similar a los publicados en la literatura sobre esta entidad.

Caso clínico: Paciente joven que evoluciona en un margen de unos 5 años desde una ligera rectificación de la columna cervical hasta una hipercifosis cervical marcada que le impide la mirada horizontal, le genera abundante dolor cervical y le impide, incluso, hasta una correcta alimentación. Presentamos el enfoque quirúrgico realizado, mediante un abordaje posterior y anterior. Una corrección de la hipercifosis cervical mediante doble abordaje: primero posterior con osteotomías cervicales grado V y colocación de tornillos desde C2 hasta T1; y después anterior con discectomías.

Discusión: La hipercifosis cervical adquirida es una patología importante a tener en cuenta, dada su aparente reversibilidad si se trata a tiempo y la mejoría del pronóstico. Se trata de una enfermedad típica en pacientes de avanzada edad y es posible confundirla con una patología degenerativa. Es importante un enfoque multidisciplinar junto con unidades de Neurología y/o Reumatología para un correcto diagnóstico de estos pacientes. Es posible verla asociada a enfermedades como Parkinson o ELA.

1130-1473/© 2025 Sociedad Española de Neurocirugía. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.